

Gislaine Dayanara Tamayo-LLiguin; Melanie Camila Medina-Crespo; Iruma Alfonso-González

<https://doi.org/10.35381/s.v.v8i1.3813>

Embarazo adolescente por violación y secuelas de depresión

Teenage pregnancy due to rape and sequelae of depression

Gislaine Dayanara Tamayo-LLiguin

gislainet17@uniandes.edu.ec

Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador

<https://orcid.org/0009-0002-0947-4010>

Melanie Camila Medina-Crespo

melaniemc23@uniandes.edu.ec

Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador

<https://orcid.org/0009-0003-4238-6132>

Iruma Alfonso-González

ua.irumaalfonso@uniandes.edu.ec

Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador

<https://orcid.org/0000-0001-6866-4944>

Recibido: 15 de octubre 2023

Revisado: 10 de diciembre 2023

Aprobado: 15 de enero 2024

Publicado: 01 de febrero 2024

Gislaine Dayanara Tamayo-LLiguin; Melanie Camila Medina-Crespo; Iruma Alfonso-González

RESUMEN

Objetivo: Analizar las secuelas de depresión en adolescentes con embarazo por violación. **Método:** Descriptiva documental, se analizaron 15 artículos científicos publicados en PubMed. **Conclusión:** Abordar el embarazo en la adolescencia requiere un enfoque integral que incluya la educación, el acceso a servicios de salud, el apoyo emocional y social, así como la promoción de relaciones saludables y el empoderamiento de las adolescentes. Reducir las tasas de embarazos en adolescentes es esencial para mejorar la salud y el bienestar de las adolescentes y promover un desarrollo saludable en todas las áreas de sus vidas.

Descriptor: Violación; delitos sexuales; depresión. (Fuente: DeCS).

ABSTRACT

Objective: To analyze the sequelae of depression in adolescents pregnant as a result of rape. **Method:** Documentary descriptive, 15 scientific articles published in PubMed were analyzed. **Conclusion:** Addressing adolescent pregnancy requires a comprehensive approach that includes education, access to health services, emotional and social support, as well as the promotion of healthy relationships and empowerment of adolescents. Reducing adolescent pregnancy rates is essential to improve the health and well-being of adolescents and promote healthy development in all areas of their lives.

Descriptors: Rape; sex offenses; depression. (Source: DeCS).

Gislaine Dayanara Tamayo-LLiguin; Melanie Camila Medina-Crespo; Iruma Alfonso-González

INTRODUCCIÓN

La violación es todo aquel acto sexual que ocurre sin consentimiento alguno, una de cada 4 mujeres pueden ser víctimas de esta violencia sexual y en lo que se enfoca este trabajo es en la violencia sexual hacia niñas menores. De la violación sexual saben las mujeres que, bajo una amenaza, debieron a fuerza entregar su cuerpo al abuso de uno o varios hombres, las niñas del centro de salud totoras entendieron que esto puede convertirse en un medio de pago vil para de esta manera conservar su vida o de igual manera evitar daños físicos irreversibles, pero lo que sí está claro es el daño psicológico permanente tras este abuso sexual, la salud mental se vuelve un caos al recordar, pensar en ello y precisar recuerdos, el problema va más allá de hablar y la mala intención del mundo ante esta situación.^{1 2 3 4 5 6 7}

La violación masiva y otras formas de violencia sexual causan un enorme dolor y afectan directa e indirectamente a las víctimas e incluso a sus familias. El patrón de abuso se debe en parte a la falta de rendición de cuentas por crímenes pasados, así como a la política de integrar a exrebeldes en las fuerzas de seguridad sin capacitación formal y a pesar de su participación en abusos contra los derechos humanos en el pasado, lamentablemente muchos de estos abusos han sido cometidos por grupos armados y terminan en mutilaciones genitales o incluso peor la muerte.^{8 9}

En muchas ocasiones, la violación de una niña se asocia con una depresión y trastornos de ansiedad. Se han demostrado que las personas que sufren de depresión severa tienen una mayor probabilidad de haber experimentado algún tipo de abuso sexual durante su infancia. La violación afecta a la víctima de muchas maneras. En primer lugar, puede generar sentimientos de miedo, terror y vergüenza. La víctima puede sentir que no está segura ni siquiera en su hogar, puede experimentar pesadillas y flashbacks del evento traumático.^{10 11}

Se tiene por objetivo analizar las secuelas de depresión en adolescentes con embarazo por violación.

Gislaine Dayanara Tamayo-LLiguin; Melanie Camila Medina-Crespo; Iruma Alfonso-González

MÉTODO

Descriptiva documental.

Se analizaron 15 artículos científicos publicados en PubMed.

Se aplicó analítica documental para el procesamiento de la información.

RESULTADOS

Se ha especulado que las adolescentes pueden ser más vulnerables a la violencia porque para ellas el rol de sexo femenino hace que su condición sea dependiente de su unión al varón y a falta de experiencia en la toma de decisiones. Las embarazadas adolescentes tienen antecedentes de violencia física, u otros antecedentes familiares relacionados con la misma. Los perpetradores son sus compañeros de citas, novios, familiares.^{12 13}

El objetivo de esta investigación se basó en conocer las consecuencias psíquicas vinculadas a la violación sexual múltiple, luego de analizar las narrativas se logra identificar que las consecuencias de salud reproductiva, salud mental, conductuales y resultados mortales, como por el Informe mundial sobre la violencia y la salud el referente al ostracismo social al obtener las narrativas de los testimonios y hacer una disección delicada de los daños psíquicos se determinan alteraciones psíquicas compartidas.¹⁴

Se habla de las consecuencias de la victimización a corto plazo son, en general, devastadoras para el funcionamiento psicológico de la víctima, sobre todo cuando el agresor es un miembro de la misma familia y cuando se ha producido una violación. Las consecuencias a largo plazo son más inciertas, si bien hay una cierta correlación entre el abuso sexual sufrido en la infancia y la aparición de alteraciones emocionales o de comportamientos sexuales inadaptados en la vida adulta.¹⁵

Gislaine Dayanara Tamayo-LLiguin; Melanie Camila Medina-Crespo; Iruma Alfonso-González

CONCLUSIONES

Abordar el embarazo en la adolescencia requiere un enfoque integral que incluya la educación, el acceso a servicios de salud, el apoyo emocional y social, así como la promoción de relaciones saludables y el empoderamiento de las adolescentes. Reducir las tasas de embarazos en adolescentes es esencial para mejorar la salud y el bienestar de las adolescentes y promover un desarrollo saludable en todas las áreas de sus vidas.

CONFLICTO DE INTERÉS

Los autores declaran que no tienen conflicto de interés en la publicación de este artículo.

FINANCIAMIENTO

Autofinanciado.

AGRADECIMIENTO

A todos los actores sociales involucrados en el desarrollo de la investigación.

REFERENCIAS

1. Lissmann R, Lokot M, Marston C. Understanding the lived experience of pregnancy and birth for survivors of rape and sexual assault. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2023;23(1):796. <https://doi.org/10.1186/s12884-023-06085-4>
2. D'Angelo DV, Liu Y, Basile KC, et al. Rape and Sexual Coercion Related Pregnancy in the United States. *Am J Prev Med*. 2024;66(3):389-398. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2023.11.001>
3. Cabar FR, Franco JB, Gorga ML. Bioethical and legal issues of termination of pregnancy resulting from rape. *Rev Assoc Med Bras (1992)*. 2022;68(10):1343-1344. <https://doi.org/10.1590/1806-9282.20220970>
4. Kizilhan JI, Steger F, Noll-Hussong M. Shame, dissociative seizures and their correlation among traumatised female Yazidi with experience of sexual

Gislaine Dayanara Tamayo-LLiguin; Melanie Camila Medina-Crespo; Iruma Alfonso-González

- violence. Br J Psychiatry. 2020;216(3):138-143.
<https://doi.org/10.1192/bjp.2020.2>
5. Gebreyesus A, Niguse AT, Shishay F, et al. Prevalence of depression and associated factors among community hosted internally displaced people of Tigray; during war and siege. BMC Psychiatry. 2024;24(1):3.
<https://doi.org/10.1186/s12888-023-05333-3>
 6. Greer KM, Simić Stanojević I, Cary KM, PettyJohn ME, Piatt JJ, Yarber WL. Barriers to reporting and lack of equitable support: abortion access for adults with autism experiencing rape-related pregnancy post-roe. J Trauma Dissociation. 2023;24(4):506-519. <https://doi.org/10.1080/15299732.2023.2212405>
 7. Bobier L. The Sexualization of Menstruation: On Rape, Tampons, and 'Prostitutes'. In: Bobel C, Winkler IT, Fahs B, Hasson KA, Kissling EA, Roberts TA, eds. The Palgrave Handbook of Critical Menstruation Studies. Singapore: Palgrave Macmillan. 2020; 303-317.
 8. Farahi N, McEachern M. Sexual Assault of Women. Am Fam Physician. 2021;103(3):168-176.
 9. Okunola TO, Awoleke JO, Olofinbiyi BA, Rosiji BO, Omoya S, Olubiyi AO. Adverse birth outcomes among women exposed to intimate partner violence in pregnancy in Ikere-Ekiti, South-west Nigeria: A prospective cohort study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2021;267:186-191.
<https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2021.11.017>
 10. Auger N, Low N, Lee GE, Ayoub A, Luu TM. Pregnancy Outcomes of Women Hospitalized for Physical Assault, Sexual Assault, and Intimate Partner Violence. J Interpers Violence. 2022;37(13-14):NP11135.
<https://doi.org/10.1177/0886260520985496>
 11. Tenaw LA, Aragie MW, Ayele AD, Kokeb T, Yimer NB. Medical and psychological consequences of rape among survivors during armed conflicts in northeast Ethiopia. PLoS One. 2022;17(12):e0278859.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0278859>
 12. Lencha B, Ameya G, Baresa G, Minda Z, Ganfure G. Intimate partner violence and its associated factors among pregnant women in Bale Zone, Southeast Ethiopia: A cross-sectional study [published correction appears in PLoS One.

Gislaine Dayanara Tamayo-LLiquin; Melanie Camila Medina-Crespo; Iruma Alfonso-González

2019 Aug 15;14(8):e0221442]. PLoS One. 2019;14(5):e0214962.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214962>

13. Dhar D, McDougal L, Hay K, et al. Associations between intimate partner violence and reproductive and maternal health outcomes in Bihar, India: a cross-sectional study. *Reprod Health*. 2018;15(1):109. <https://doi.org/10.1186/s12978-018-0551-2>
14. Shamu S, Munjanja S, Zarowsky C, Shamu P, Temmerman M, Abrahams N. Intimate partner violence, forced first sex and adverse pregnancy outcomes in a sample of Zimbabwean women accessing maternal and child health care. *BMC Public Health*. 2018;18(1):595. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5464-z>
15. Lencha B, Ameya G, Beressa G, Minda Z, Ganfure G. Correction: Intimate partner violence and its associated factors among pregnant women in Bale Zone, Southeast Ethiopia: A cross-sectional study. *PLoS One*. 2019;14(8):e0221442. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221442>